

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «НПК ИТ»
Садовничий В.Е.



ИНСТРУКЦИЯ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВА АКТЕРМ АНТИСЕПТ

Применение средства «АКТЕРМ Антисепт» в виде жидкости.

Гигиеническая обработка рук: на сухие руки (без предварительного мытья водой и мылом) наносят не менее 3 мл средства и втирают его в кожу до высыхания, но не менее 15-20 секунд, обращая особое внимание на тщательность обработки кончиков пальцев, кожи вокруг ногтей, между пальцами.

Следует придерживаться определённому алгоритму, нанося и распределяя антисептик по поверхности кожи рук:

- сначала необходимо растереть одну ладонь о другую, захватывая запястья;
- далее необходимо приступить к обрабатыванию тыльных сторон кистей рук;
- потом следует растереть каждый палец по отдельности;
- затем большой палец и пространство между пальцами, а также область верхней фаланги с ногтем.

Перед обработкой необходимо:

- снять украшения с пальцев и запястий;
- очистить лак с ногтей и коротко постричь ногти;
- освободить обе руки до зоны предплечий.

Для профилактики туберкулеза и вирусных инфекций обработку рук проводят дважды, используя каждый раз не менее 3 мл средства, общее время обработки не менее 2 мин.

Профилактическая обработка ступней ног (после посещения бассейна, сауны, душевой и др.): салфеткой или ватным тампоном, обильно смоченным средством (не менее 3 мл), тщательно протереть кожу каждой ступни ног разными тампонами, время обработки каждой ступни — не менее 1 мин.

Обработка перчаток, надетых на руки персонала: для обеззараживания поверхности перчаток в сжатую ладонь руки в перчатке наносят 2,5 мл средства. Затем в течение 15 секунд протирают этой порцией средства поверхность перчаток обеих рук, совершая движения рук, которые выполняют при обработке кожи рук антисептиком. После этого такую же операцию проводят, нанося 2,5 мл раствора на ладонь

второй руки в перчатке. Общее время обработки 30 секунд. Время дезинфекционной выдержки — 5 мин.

После обработки средством перчатки необходимо снять с рук и направить на утилизацию, а затем провести гигиеническую обработку рук средством «АКТЕРМ Антисептик».

Дезинфекция небольших по площади твердых поверхностей и предметов обстановки в помещениях, на санитарном транспорте, санитарно-технического оборудования, наружных поверхностей приборов, аппаратов, проводится способом протирания или орошения. Норма расхода средства при протирании — 100 мл/м.кв; при орошении — от 150 мл/м.кв. Обработка проводится однократно или двукратно.

Поверхности, предметы обстановки, санитарно-техническое оборудование равномерно орошают средством до полного смачивания или протирают салфеткой, обильно смоченной средством. Поверхности, подлежащие дезинфекции, должны быть увлажнены средством полностью и равномерно по всей плоскости. Средство быстро высыхает, не оставляя следов на поверхности. Поверхности можно использовать после полного высыхания средства. В случае необходимости поверхности можно протереть салфеткой по окончании времени дезинфекционной выдержки, не дожидаясь высыхания.

Средство не рекомендуется применять для обработки поверхностей, покрытых низкосортными или спирторастворимыми красками и лаками, из органического (акрилового) стекла, жк экранов и других материалов, не устойчивых к воздействию спирта. Перед применением рекомендуется проверить действие средства на небольшом малозаметном участке поверхности.

В парикмахерских, банях, саунах, бассейнах, спортивных комплексах, косметических салонах дезинфекцию объектов проводят по режимам, рекомендованным при дерматофитиях (орошение или протирание раствором до 1 минуты).

Дезинфекция резиновых, пластиковых, полипропиленовых коврикков: коврикки, имеющие ровную поверхность, равномерно протирают ветошью, обильно смоченной средством, их до полного увлажнения, время дезинфекционной выдержки 5 мин. При обработке коврикков способом орошения время дезинфекционной выдержки – 10 минут

Дезинфекция обуви: внутреннюю поверхность обуви двукратно протирают разными салфетками, смоченными средством, используя на одну пару обуви на каждую обработку две салфетки, время дезинфекционной выдержки 5 минут. Или двукратно с интервалом 5 минут орошают внутреннюю поверхность обуви до полного увлажнения, общее время дезинфекционной выдержки 10 минут.

Дезинфекция наружных поверхностей медицинских приборов и аппаратов, физиотерапевтического оборудования, протирают разными салфетками, смоченными средством, общее время дезинфекционной выдержки — 5 минут, при туберкулезе — 10 минут.

Применение средства «АКТЕРМ Антисептик» в виде геля.

Гигиеническая обработка рук: на сухие руки (без предварительного мытья водой и мылом) наносят не менее 3 мл средства и втирают его в кожу до высыхания, но не менее 30 секунд, обращая особое внимание на тщательность обработки кончиков пальцев, кожи вокруг ногтей, между пальцами.

Для профилактики туберкулеза и вирусных инфекций обработку рук проводят дважды, используя каждый раз не менее 3 мл средства, общее время обработки не менее 2 мин.

Обработка рук хирургов, операционных медицинских сестер, акушерок и других лиц, участвующих в проведении операций, приеме родов: перед применением средства кисти рук и предплечий предварительно тщательно моют теплой проточной водой и туалетным мылом (предпочтительно жидким) в течение 2 минут, после чего их высушивают стерильной марлевой салфеткой. Затем на кисти рук наносят трижды по 5 мл средства, равномерно распределяя и втирая его в кожу обеих кистей

рук и предплечий до полного впитывания средства. Общее время обработки — 3 минуты. Примечание: стерильные перчатки надевают на сухие руки.

При наличии биологических загрязнений (органических и др.) на обрабатываемых поверхностях, необходимо одной салфеткой удалить загрязнение, а другой провести повторную обработку.

Средство обладает пролонгированным действием не менее 3 часов.

Профилактическая обработка ступней ног (после посещения бассейна, сауны, душевой и др.): салфеткой или ватным тампоном, обильно смоченным средством (не менее 3 мл), тщательно протереть кожу каждой ступни ног разными тампонами, время обработки каждой ступни – не менее 1 мин.

Обработка перчаток, надетых на руки персонала: для обеззараживания поверхности перчаток в сжатую ладонь руки в перчатке наносят 2,5 мл средства. Затем в течение 30 секунд протирают этой порцией средства поверхность перчаток обеих рук, совершая движения рук, которые выполняют при обработке кожи рук антисептиком. После этого такую же операцию проводят, нанося 2,5 мл раствора на ладонь второй руки в перчатке. Общее время обработки 1 минута. Время дезинфекционной выдержки — 5 мин.

После обработки средством перчатки необходимо снять с рук и направить на утилизацию, а затем провести гигиеническую обработку рук средством «АКТЕРМ Антисептик».

Объект обеззараживания	Время обеззараживания, мин	Способ Обеззараживания
Трубки телефонных аппаратов, дверные ручки, выключатели, журнальные и обеденные столики, подлокотники кресел, туалетные полочки, тумбочки, ручки кранов и сливных бачков, сиденье унитаза в туалетных комнатах.	3	Орошение или протирание

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Использовать только по назначению для наружного применения. Запрещается принимать внутрь!

Избегать попадания средства в глаза, органы дыхания, на поврежденную кожу.

Обработку небольших по площади поверхностей способом протирания в норме расхода можно проводить без средств защиты органов дыхания и в присутствии пациентов (больных). При превышении нормы расхода рекомендуется использовать универсальные респираторы марки РУ-60М или РПГ-67 с патроном марки А и защитные очки, а обработку проводить в отсутствии пациентов.

Обработку небольших по площади поверхностей способом орошения проводить с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания, и в отсутствии пациентов.

Средство легко воспламеняется. Не допускать контакта с открытым пламенем или включенными нагревательными приборами. Не курить!

Не обрабатывать поверхности объектов, портящиеся от воздействия спиртов.

Средство должно применяться непосредственно из оригинальной упаковки изготовителя. Разбавление средства водой или другими растворителями, а также смешивание с другими средствами не допускается.

Не использовать по истечении срока годности.

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ОТРАВЛЕНИИ

При случайном попадании средства в глаза их следует обильно промыть проточной водой и закапать 1-2 капли 30% раствор сульфацила натрия.

При попадании средства в желудок промыть желудок большим количеством воды, вызвать рвоту. Затем принять активированный уголь (10-12 измельченных таблеток).

При появлении на коже раздражения, сыпи – прекратить применение средства, руки вымыть водой с мылом.

При появлении признаков раздражения органов дыхания следует прекратить работу со средством, пострадавшего немедленно вывести на свежий воздух или в другое помещение, а помещение проветрить. Дать теплое питье. Рот и носоглотку прополоскать водой.

При необходимости обратиться к врачу.